申請日	2016年10月17日

登録日	2016/10/17(更新2017/05/18)

腫瘍名	小細胞肺がん

申請医師	砂田　幸一

通常の投与期間	

投与スケジュール


レジメン名

1回に要する時間:　2 時間 30 分

小細胞　CBDCA+ETP

クールの概要

3週間が1クール
CBDCAは1日目に投与
ETPは1,2,3日目に投与



	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	3	4	5	6	7	22	23	24
①	メイン	生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓	↓	↓					↓	↓	↓
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ パロノセトロン	9.9mg 0.75mg	点滴	15分	↓							↓		
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ3.3mg 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分		↓	↓						↓	↓
③	側管2	カルボプラチン 生食	AUC5 500L	点滴	60分	↓							↓		
④	側管3	エトポシド 5%ブドウ糖	80mg/㎡ 500mL	点滴	60分	↓	↓	↓					↓	↓	↓

注意事項

アプレピタント併用時はデキサメタゾン6.6mgに減量すること
エトポシドは溶解時濃度0.4mg/ml以下とする
ポリカーボネート製の三方活栓や延長チューブ、DEHPを含むポリ塩化ビニル製点滴セットの使用は避ける

申請日	2016年11月

登録日	2016/11/1(2017/05/18)

腫瘍名	小細胞肺がん

申請医師	砂田　幸一

通常の投与期間	ヶ月、　　年、PDもしくは有害事象出現までの無期限、その他(

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　2　時間　45分

小細胞　CPT11+CBDCA

クールの概要

4週が1クール
Day1．8．(15)に投与

1クール　　2クール
1　8　15　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間	↓		↓		↓					↓			
①	メイン	生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓					↓			
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ	9.9mg 0.75mg	点滴	15分	↓		↓		↓					↓			
③	側管2	ｲﾘﾉﾃｶﾝ 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	60mg/㎡ 250mL	点滴	60分	↓		↓		↓					↓			
③	側管3	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	AUC5 250mL	点滴	60分	↓									↓			

注意事項

アプレピタント併用時はデキサメタゾン6.6mgに減量すること

参考文献

申請日	2016年11月

登録日	2016/11/1(2020/04/21)

腫瘍名	小細胞肺がん

申請医師	砂田　幸一

通常の投与期間	ヶ月、　　年、PDもしくは有害事象出現までの無期限、その他（

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　時間　　分

小細胞　CPT11+CDDP

クールの概要

4週が1クール
CDDPはDAY1に投与
イリノテカンはDAY1、8、15に投与

1クール　　2クール
1 2 3 4 5 6 7 8　　15　　29

	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	15	29
①	メイン	生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓							↓	↓	↓
②	側管1	フィジオ140	500mL	点滴	60分	↓									↓
③	側管2	ﾃﾞｷｻｰﾄ パロノセトロン アロカリス	9.9㎎ 0.75mg 235mg	点滴	30分	↓							↓	↓	↓
④	側管3	デキサート パノロセトロン	9.9mg 0.75mg	点滴	15分										
⑤	側管4	イリノテカン 5%ブドウ糖	60mg/㎡ 250mL	点滴	60分	↓							↓	↓	↓
⑥	メイン	20%マンニトール	300mL	点滴	30分	↓									↓
⑥	側管5	シスプラチン 生食	60mg/㎡ 500mL	点滴	120分	↓									↓
⑦	メイン	フィジオ140	500mL	点滴	1～2時間	↓									↓
⑧	メイン	フィジオ140	1000ml 20mg	点滴	8時間	↓									↓
	メイン	フィジオ140 デキサート	500mL 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓						
	メイン	フィジオ140	500mL	点滴	4時間					↓					
	メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000mL 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓					

注意事項

投与当日は少なくとも3000mL/日の尿量を確保すること。