申請日	2024/10/28

登録日	2024/11/8

腫瘍名	MSI-High固形がん

申請医師	尾関　伸司

通常の投与期間	ヶ月、　　年、PDもしくは有害事象出現までの無期限、その他（

投与スケジュール


レジメン名

1回に要する時間：　時間30 分

MSI-High-Pembrolizumab-3w

クールの概要

3週間で1クール
第1日目に投与。



	種別	薬剤	用量	用法	時間	↓								↓			
①	メイン	生食	100mL	点滴	開始から終了まで												
②	側管1	キイトルーダ 生食	200mg 100mL	点滴	30分	↓								↓			

注意事項

高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する固形がん（2次治療以降）
MSI-Highを有する結腸癌・直腸癌（1次治療）
インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。
凍結を避け、バイアルを振盪しないこと
希釈後の最終濃度を1～10mg/mLとすること
希釈後の液を保管する場合は、希釈から投与終了までの時間を、25℃以下で6時間以内又は2～8℃で96時間以内とすること。投与前に点滴バックを常温に戻すこと。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと

参考文献

キイトルーダ点滴静注　添付文書　2021年8月改訂版
国際共同第Ⅱ相試験(KEYNOTE-158試験)

申請日	2024/10/28

登録日	2024/11/8

腫瘍名	MSI-High固形がん

申請医師	尾関　伸司

通常の投与期間	ヶ月、　　年、PDもしくは有害事象出現までの無期限、その他（

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間：　時間30 分

MSI-HighPembrolizumab-6w

クールの概要

6週間で1クール
第1日目に投与。

1クール　　2クール
1　　43　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間	↓								↓			
①	メイン	生食	100mL	点滴	開始から終了まで	↓								↓			
②	側管1	キイトルーダ 生食	400mg 100mL	点滴	30分	↓								↓			

注意事項

高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する固形がん（2次治療以降）
MSI-Highを有する結腸癌・直腸癌（1次治療）
インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。
凍結を避け、バイアルを振盪しないこと
希釈後の最終濃度を1～10mg/mLとすること
希釈後の液を保管する場合は、希釈から投与終了までの時間を、25℃以下で6時間以内又は2～8℃で96時間以内とすること。投与前に点滴バックを常温に戻すこと。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと

参考文献

キイトルーダ点滴静注　添付文書　2021年8月改訂版
国際共同第Ⅱ相試験(KEYNOTE-158試験)